



Presidio Ospedaliero

Unità Operativa Complessa di

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Direttore Prof. G. C. Caletti

Terapia anti Helicobacter Pylori_Quadruplica Concomitante

Sig./Sig.ra _____

Durata della cura: 30 giorni.

I farmaci da assumere sono i seguenti:

- Pariet cp 20 mg
- Amoxicillina cp 1 g
- Metronidazolo cp 250 mg
- Claritromicina cp 500 mg
- ZirComBi buste

Dal 1° al 5° giorno

Appena svegli: 1 cp di Pariet. Dopo circa 30 minuti fare colazione.

Dal 6° al 19° giorno (14 giorni consecutivi)

Appena svegli: 1 cp di Pariet. Dopo circa 30 minuti fare una abbondante colazione.

Dopo colazione: 1 cp di Amoxicillina + 1 cp di Claritromicina + 2 cp di Metronidazolo.

Ore 17:00 circa: 1 bustina di ZirComBi

30 minuti prima di cena: 1 cp di Pariet.

Dopo cena: 1 cp di Amoxicillina + 1 cp di Claritromicina + 2 cp di Metronidazolo.

Dal 20° al 30° giorno

Appena svegli: 1 cp di Pariet. Dopo circa 30 minuti fare colazione.

Terminata la cura, non assumere altri farmaci inibitori di pompa protonica ("prazoli") e dopo circa 2 mesi eseguire: C13 Urea Breath Test.

Lì, _____

Prof. Giancarlo Caletti