



**Presidio Ospedaliero**

Unità Operativa Complessa di

**GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA**

Direttore Prof. G. C. Caletti

---

**Terapia anti Helicobacter Pylori\_Quadruplica Bismuto**

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Durata della cura: 30 giorni.

I farmaci da assumere sono i seguenti:

- Pariet cp 20 mg
- Bismuto subsalicilato cp 300 mg (preparazione galenica in farmacia)
- Metronidazolo cp 250 mg
- Ambramicina cp 250 mg
- ZirComBi buste

**Dal 1° al 5° giorno**

Appena svegli: 1 cp di Pariet. Dopo circa 30 minuti fare colazione.

**Dal 6° al 19° giorno (14 giorni consecutivi)**

Appena svegli: 1 cp di Bismuto subsalicilato +1 cp di Pariet. Dopo circa 30 minuti fare una abbondante colazione.

Dopo colazione: 2 cp di Ambramicina + 2 cp di Metronidazolo.

30 minuti prima di pranzo: 1 cp di Bismuto subsalicilato.

Dopo pranzo: 2 cp di Ambramicina + 2 cp di Metronidazolo.

Ore 17:00 circa: 1 bustina di ZirComBi

30 minuti prima di cena: 1 cp di Bismuto subsalicilato +1 cp di Pariet.

Dopo cena: 2 cp di Ambramicina + 2 cp di Metronidazolo.

Prima di coricarsi: 1 cp di Bismuto subsalicilato.

**Dal 20° al 30° giorno**

Appena svegli: 1 cp di Pariet. Dopo circa 30 minuti fare colazione.

*Terminata la cura, non assumere altri farmaci inibitori di pompa protonica ("prazoli") e dopo circa 2 mesi eseguire: C13 Urea Breath Test.*

Lì, \_\_\_\_\_

Prof. Giancarlo Caletti